

適用拡大情報

農林水産省登録
第15443号

除草剤

グラメックス水和剤

シアナジン水和剤

平成24年2月8日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「芝(日本芝)」を「日本芝」に変更し、「秋冬期 雑草発生初期(生育休止期)」の使用量(薬量)「100~200g/10a」を「50~200g/10a」へ変更。

下線が変更部分です。

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | シアナジンを含む農薬の総使用回数 | |
|---------------------|------|-------|--|---------------------|----------|---------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | 薬量 | 希釈水量 | | | | | |
| ばれいしょ | — | 一年生雑草 | 植付後萌芽前 | 100~150g /10a | 100L/10a | 1回 | 全面 土壌 散布 | 北海道 | 1回 | |
| | | | | 200~300g /10a | | | | 全域 (北海道を除く) | | |
| たまねぎ (直播栽培) | | | 播種後出芽前 (雑草発生前) | 75~100g /10a | | | | 北海道 | | |
| たまねぎ | | | 定植活着後 (雑草発生前) | 100~200g /10a | | | | 全域 | | |
| アスパラガス | | | 萌芽前又は 収穫後 (雑草発生前) | | | | | | | |
| <u>日本芝</u> | | | 春期雑草 発生前 | 200~400g /10a | | | | | | 2回以内 |
| | | | 秋冬期雑草 発生初期 | <u>50~200g /10a</u> | | | | | | |
| 桑 | | | 桑発芽前 (雑草発生前) | 200~300g /10a | | | | | | |
| すぎ(床替床) ひのき(床替床) | | | | | | | | | | |
| 樹木等 | | | 公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 宅地、 運動場、 のり面等 | 雑草発生前 | | | | | | 300~600g /10a |

<使用上の注意事項の変更>

【変更前】

- 日本芝で春期に使用する場合、芝の萌芽期以降の散布は黄化褐変等の薬害を生ずるおそれがあるのでさけること。また、秋冬期に使用する場合は、一時的に葉身に白化や黄化などの薬害を生じる場合があるので、芝生育期（生育休止期）に使用すること。尚「芝生育期（生育休止期）」とは、茎葉の一部に緑色が残っていても、生育の停滞している時期を指す。

【変更後】

- 日本芝で春期に使用する場合、芝の萌芽期以降の散布は黄化褐変等の薬害を生ずるおそれがあるのでさけること。また、秋冬期に使用する場合は、一時的に葉身に黄化や退色などの薬害を生じる場合があるので、芝生育期（生育休止期）に使用すること。尚「芝生育期（生育休止期）」とは、茎葉の一部に緑色が残っていても、生育の停滞している時期を指す。

アグロカネシヨウ株式会社