

**適用拡大情報**

農林水産省登録  
第14359号

殺菌剤  
**キノンドー水和剤 80**  
有機銅水和剤

平成24年3月7日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「りんご」の適用病害虫名に「黒点病」を追加。
- 作物名「芝（ベントグラス）」を「西洋芝（ベントグラス）」に変更。

**太字**が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒星病 黒斑病	1200～2000倍	200～700L/10a	収穫3日 前まで	9回以内	散布	9回以内
	輪紋病	1200倍					
りんご	黒星病 斑点落葉病	1200～1600倍		収穫14日 前まで	4回以内		7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)
	輪紋病 褐斑病 炭疽病 すす斑病 すす点病 <b>黒点病</b>	1200倍					
	マルメロ かりん	黒点病					
ごま色斑点病	1200倍						
かき	炭疽病 うどんこ病	1000～1400倍		1000倍	5回以内		8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)
	落葉病	1000倍					
みかん	黒点病	800～1000倍		800倍	収穫30日 前まで		5回以内
	灰色かび病	800倍					
かんきつ (みかん を除く)	黒点病	800～1000倍	800倍	収穫60日 前まで	3回以内		
	灰色かび病 幹腐病	800倍					
ぶどう	黒とう病	1200～1600倍	1200倍	収穫45日 前まで	4回以内 (開花後は1回)	4回以内 (開花後は1回以内)	
	べと病						
はくさい	軟腐病	100～300L/10a	100～300L/10a	収穫30日 前まで	5回以内	5回以内	
レタス	腐敗病	1200～1600倍	1200～1600倍	収穫21日 前まで			
食用ゆり	鱗茎さび症	50倍	—	植付前	1回	球根瞬間浸漬	1回
麦類 (小麦を 除く)	雪腐病	400～800倍	100～200L/10a	根雪前	2回以内	散布	2回以内
小麦	眼紋病	400倍	60～150L/10a	収穫60日 前まで	5回以内		5回以内 (種子への処理は 1回以内)
芝	雪腐病	200～400倍 80～100倍	0.5～1L/m <sup>2</sup> 0.2～0.25L/m <sup>2</sup>	根雪前	3回以内		5回以内
<b>西洋芝</b> ( <b>ペンタグラス</b> )	雪腐小粒菌核病	40倍	0.1L/m <sup>2</sup>				
シクラメン	葉腐細菌病	10倍	2～5ml/株	発病初期	4回以内	葉柄基部散布	

使用上の注意事項などについては、製品ラベルを参照のこと。

アグロカネショウ株式会社