

殺虫剤
アルバリン粒剤
ジノテフラン粒剤

平成24年4月26日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「レタス」「非結球レタス」「にがうり」を追加する。
- 「ねぎ」の使用時期に「生育期 但し、収穫3日前まで」を追加する。
- 「ねぎ」の適用病害虫名「アザミウマ類」の使用時期及び使用方法に「は種時」及び「播溝土壌混和」を追加する。
- 「ねぎ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)」に変更する。
- 「だいこん」の適用病害虫名「キスジノミハムシ」の使用 방법에「全面土壌混和」を追加する。
- 「だいこん」の適用病害虫名「キスジノミハムシ」の使用 방법에「散布」を使用時期「生育期 但し、収穫30日前まで」で追加する。
- 「だいこん」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「5回以内(は種時の粒剤の播溝土壌混和は1回以内、は種時の粒剤の全面土壌混和は1回以内、生育期の粒剤の散布は1回以内、生育期の水溶剤の散布は2回以内)」に変更する。
- 「こまつな」、「みずな」と「非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、チンゲンサイを除く)」を統合し、作物名「非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)」とし、「非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。
- 「なばな類」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。
- 「きゅうり」の適用病害虫名「コナジラミ類」の使用時期「育苗期」の使用量を「1g/株」から「1~2g/株」に変更する。
- 「メロン」の適用病害虫名「コナジラミ類」の使用時期「育苗期」の使用量を「1g/株」から「1~2g/株」に変更する。
- 「なす」の適用病害虫名「コナジラミ類」の使用時期「育苗期」の使用量を「1g/株」から「1~2g/株」に変更する。
- 「ピーマン」の適用病害虫名に「コナジラミ類」を使用時期「育苗期」、使用方法「株元散布」で追加する。
- 「とうがらし類」の適用病害虫名に「コナジラミ類」を使用時期「育苗期」、使用方法「株元散布」で追加する。

下線が変更部分、太字が拡大部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
きゅうり	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	ハモグリバエ類 アザミウマ類		定植時		植穴 土壌混和	
	コナジラミ類	<u>1~2g/株</u>	育苗期		株元散布	
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫 14日前まで			
	コナジラミ類 アブラムシ類		定植時			
メロン	アブラムシ類	1g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、散布は2回以内)
	コナジラミ類	<u>1~2g/株</u>	育苗期		植穴 土壌混和	
		1~2g/株	定植時		株元散布	
	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期		植穴 土壌混和	
	アザミウマ類		定植時		株元散布	
にがうり	コナジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴 土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
なす	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	1~2g/株	定植時		植穴 土壌混和	
	コナジラミ類	<u>1~2g/株</u>	育苗期		株元散布	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴 土壌混和	
	コナジラミ類 アブラムシ類		生育期 但し、 収穫前日まで		2回以内	
ピーマン	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴 土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株				
	コナジラミ類		育苗期	1回		

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
とうがらし類	アザミウマ類	1~2g/株	定植時 生育期 但し、 収穫 14 日前 まで 育苗期	1 回	植穴 土壌混和	4 回以内 (育苗期の株 元散布及び 定植時の土 壌混和は合 計 1 回以内、 定植後の株 元散布は 1 回以内、 散布は 2 回 以内)	
	アブラムシ類	1g/株			株元散布		
	コナジラミ類						
レタス 非結球レタス	ナモグリバエ	培土 1L 当り 15g	は種前	1 回	培土混和	4 回以内 (は種前の 培土混和は 1 回以内、 育苗期の株 元散布、定 植時の土壌 混和及び育 苗トレイへ の灌注は 合計 1 回以 内、散布は 2 回以内)	
		1g/株	育苗期後半		株元散布		
	アブラムシ類 ナモグリバエ	2g/株	定植時		植穴 土壌混和		
ねぎ	アザミウマ類	6kg/10a	は種時	1 回	播溝 土壌混和	<u>4 回以内</u> (<u>は種時の土</u> <u>壌混和、育</u> <u>苗トレイへ</u> <u>の灌注及び</u> <u>定植時の株</u> <u>元散布は合</u> <u>計 1 回以内</u> <u>、生育期の</u> <u>株元</u> <u>灌注は</u> <u>1 回以内</u> <u>、散布及び</u> <u>定植後</u> <u>の株元散</u> <u>布は合計</u> <u>2 回以内</u>)	
			定植時		株元散布		
	アザミウマ類 ハモグリバエ類			生育期 但し、 収穫 3 日前 まで	2 回以内		
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1 回	播溝 土壌混和		<u>5 回以内</u> (<u>は種時の粒</u> <u>剤の播溝土</u> <u>壌混和は 1</u> <u>回以内</u> <u>、は種時</u> <u>の粒剤の全</u> <u>面</u> <u>土壌混和は</u> <u>1 回以内</u> <u>、生育期</u> <u>の粒剤の</u> <u>散布は 1 回</u> <u>以内</u> <u>、生育期</u> <u>の水溶剤</u> <u>の散布は 2</u> <u>回以内</u>)
		4~6kg/10a				全面 土壌混和	
		9kg/10a					
		キスジノミハムシ	6kg/10a		生育期 但し、 収穫 30 日前 まで		

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
<u>非結球あぶらな科葉菜類</u> (<u>チンゲンサイを除く</u>)	アブラムシ類 キスジノミハムシ	6kg/10a	は種時	1回	播溝 土壌混和	<u>3回以内</u> (<u>は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内</u>)
なばな類	アブラムシ類					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

アグロ カネショウ株式会社