

殺虫剤  
アルバリン粒剤

ジノテフラン粒剤

平成24年7月11日付けで以下の通り適用拡大されました。

&lt;変更内容&gt;

- 「ねぎ」の適用病害虫名「ハモグリバエ類」の使用時期に「生育期 但し、収穫3日前まで」を使用量「9kg/10a」で追加する。
- 「だいこん」の適用病害虫名「キスジノミハムシ」の使用方法に「全面土壌混和」を使用量「12kg/10a」で追加する。
- 作物名に「ズッキーニ」を追加する。

**太字**が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ハモグリバエ類	<b>9kg/10a</b>	生育期 但し、 収穫3日前 まで	2回以内	株元散布	4回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及び 定植時の株元散布は 合計1回以内、 生育期の株元灌注は1回以内、 散布及び定植後の株元散布は 合計2回以内)
だいこん	キスジノミハムシ	<b>12kg/10a</b>	は種時	1回	全面 土壌混和	5回以内 (は種時の粒剤の播溝土壌混和は 1回以内、は種時の粒剤の 全面土壌混和は1回以内、 生育期の粒剤の散布は1回以内、 生育期の水溶剤の散布は 2回以内)
<b>ズッキーニ</b>	コナジラミ類 アブラムシ類	2g/株	定植時		植穴 土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。