

**適用拡大情報**

農林水産省登録  
第20806号

殺虫剤  
**アルバリン粒剤**

ジノテフラン粒剤

平成24年12月19日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 「ねぎ」の適用病害虫名「ハモグリバエ類」の使用時期及び使用方法に「は種時」及び「播溝土壌混和」を追加する。
- 作物名に「ふき」を追加する。
- 「花き類・観葉植物（きく、ガーベラを除く）」、「きく」、「ガーベラ」の使用法「株元散布」の本剤の使用回数を「5回以内」に変更する。
- 「花き類・観葉植物（きく、ガーベラを除く）」、「きく」、「ガーベラ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「5回以内（土壌混和は1回以内）」に変更する。

下線が変更、**太字**が追加部分です。

| 作物名                          | 適用病害虫名           | 使用量                         | 使用時期                                      | 本剤の使用回数     | 使用方法          | ジノテフランを含む農薬の総使用回数                                                               |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ねぎ                           | ハモグリバエ類          | 6kg/10a                     | <b>は種時</b>                                | 1回          | <b>播溝土壌混和</b> | 4回以内<br>(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| <b>ふき</b>                    | アブラムシ類           | 20kg/10a                    | 定植後～生育期<br>(草丈20cm頃まで)<br>但し、<br>収穫45日前まで |             | 土壌表面散布        | 3回以内<br>(粒剤は1回以内、<br>水溶剤は2回以内)                                                  |
| きく<br>ガーベラ                   | マメハモグリバエ         | 2g/株<br>(但し、10a 当り 30kg まで) | 定植時                                       |             | 植穴<br>土壌混和    | <u>5回以内</u>                                                                     |
|                              | コナジラミ類<br>アブラムシ類 | 1g/株<br>(但し、10a 当り 30kg まで) |                                           |             |               |                                                                                 |
|                              | アブラムシ類           | 20kg/10a                    | 生育期                                       | 株元散布        |               |                                                                                 |
| 花き類・<br>観葉植物<br>(きく、ガーベラを除く) | コナジラミ類<br>アブラムシ類 | 1g/株<br>(但し、10a 当り 30kg まで) | 定植時                                       | 1回          | 植穴<br>土壌混和    |                                                                                 |
|                              | アブラムシ類           | 20kg/10a                    | 生育期                                       | <u>5回以内</u> | 株元散布          |                                                                                 |

<使用上の注意事項の追加>

- ふきに使用する場合には、葉に付着した薬剤は払い落とすこと。