

殺虫剤

サムコルフロアブル10

クロラントラニプロール水和剤

平成 24 年 12 月 28 日付で以下の通り適用拡大されました。

< 変更内容 >

- 作物名「あんず」、「小粒核果類（すもも、あんずを除く）」、「かき」を追加する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫前日まで」に変更し、適用病害虫「ケムシ類」の希釈倍数を、「5000倍」から「2500～5000倍」に変更する。
- 作物名「茶」に適用病害虫「ハスモンヨトウ」を追加する。
- 作物名「もも」及び「ネクタリン」に適用病害虫「ハマキムシ類」を追加する。
- 作物名「すもも」に適用病害虫「アメリカシロヒトリ」を追加する。

太字が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数				
茶	チャノコクモンハマキ チャハマキ, ヨモギエダシヤク	2000 倍	200～ 400L/10a	摘採 3 日前まで	1 回	散布	1 回				
	チャノホリガ	2000～ 4000 倍									
	ハスモンヨトウ	4000 倍									
りんご	キンモンハマグリガ キンモンホリガ, ハマキムシ類 シクイムシ類, ケムシ類	2500～ 5000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内				
	ヨモギエダシヤク	5000 倍									
ぶどう	モンキクロノメガ チャノコクモンハマキ							2500 倍			
おうとう	ケムシ類, ハマキムシ類 オウトウショウジ ヨウバエ										
なし	ケムシ類	<u>2500～</u> <u>5000 倍</u>							200～ 700L/10a	<u>収穫前日まで</u>	2 回以内
	シクイムシ類, ハマキムシ類	5000 倍									
もも	シクイムシ類, ハマキムシ類					5000 倍		収穫前日まで	2 回以内	2 回以内	
ネクタリン	モモハマグリガ							収穫 3 日前まで			
かき	カキハマシガ ヒロヘリアオイガ	2500 倍				収穫前日まで		3 回以内	3 回以内		
小粒核果類(すもも、あんずを除く)	アメリカシロヒトリ		収穫 14 日前まで								
すもも	シクイムシ類 アメリカシロヒトリ		収穫 3 日前まで								
あんず	アメリカシロヒトリ										