

殺菌剤  
**シトラノフロアブル**  
有機銅・TPN水和剤

平成25年3月27日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「キャベツ」のTPNを含む農薬の総使用回数「2回以内（は種又は定植前の土壌混和は1回以内）」を「3回以内（は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内）」に変更する。

下線が変更部分です。

| 作物名    | 適用病害虫名   | 希釈倍数           | 使用時期                        | 本剤の使用回数  | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数                 | TPNを含む農薬の総使用回数                                     |                                 |
|--------|--|----------------|-----------------------------|----------|------|--------------------------------|--|---------------------------------|
| りんご    | 斑点落葉病<br>黒点病<br>褐斑病<br>すす斑病<br>すす点病<br>輪紋病<br>モニリア病<br>炭疽病 | 1000倍          | 収穫45日前まで                    | 3以内      | 散布   | 7回以内<br>(塗布は3回以内、<br>散布は4回以内)  | 3回以内   |                                 |
| かき     | 落葉病<br>うどんこ病<br>炭疽病  |                | 着色期前まで<br>(但し、収穫<br>30日前まで) |          |      | 8回以内<br>(塗布は3回以内、<br>散布は5回以内)  |  |                                 |
| 西洋なし   | 輪紋病<br>ごま色斑点病  |                | 収穫30日前まで                    |          |      | 12回以内<br>(塗布は3回以内、<br>散布は9回以内) |  | 3回以内<br>(休眠期は1回以内)              |
| きゅうり   | 褐斑病<br>べと病<br>斑点細菌病  | 1000～<br>1200倍 | 収穫前日まで                      | 5回以内     |      | 5回以内                           | 10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)          |                                 |
| キャベツ   | 黒腐病<br>べと病   |                | 収穫14日前まで                    | 2回以内     |      | 3回以内                           | <u>3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内)</u> |                                 |
| はくさい   | 軟腐病<br>べと病<br>白斑病  |                | 収穫30日前まで                    |          |      |                                | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)                    |                                 |
| レタス    | すす枯病<br>腐敗病<br>べと病   |                | 1000倍                       | 収穫21日前まで |      | 3回以内                           | 5回以内   | 5回以内<br>(土壌灌注は2回以内、<br>散布は3回以内) |
|        | 軟腐病  |                |                             |          |      |                                |  |                                 |
| アスパラガス | 茎枯病<br>斑点病<br>褐斑病  | 1000～<br>1200倍 | 収穫3日前まで                     |          |      |                                | 3回以内   |                                 |
| しょうが   | 白星病<br>紋枯病   | 1000倍          | 収穫14日前まで                    | 5回以内     |      |                                | 5回以内   |                                 |
| やまのいも  | 炭疽病<br>葉渋病   | 1000～<br>1200倍 | 収穫30日前まで                    |          |      |                                | 6回以内   |                                 |

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。