

殺菌剤
アフェットフロアブル
ペンチオピラド水和剤

平成 25 年 5 月 15 日付で以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名に「すいか」、「アスパラガス」、「ねぎ」、「非結球レタス」、「みかん」、「かき」、「ネクタリン」を追加する。

太字が追加部分です。

b>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数
すいか	菌核病 つる枯病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
アスパラガス	茎枯病				4 回以内		4 回以内
ねぎ	白絹病	1000～ 2000 倍	1 L/m ²	生育期但し、収穫 14 日前まで	2 回以内	株元 灌注	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、 散布は 2 回以内)
		さび病 黒斑病	2000 倍	100～ 300L/10a			
非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病						
みかん	灰色かび病 そうか病						
かき	落葉病						
ネクタリン	灰星病 黒星病		200～ 700L/10a				3 回以内

<安全使用上の注意の追加>

【 魚毒性 】

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。