

適用拡大情報

農林水産省登録
第20603号

除草剤

アーケース粒剤

ブタクロール・ACN粒剤

平成26年5月14日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「移植水稻」の適用地帯「関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」の適用土壌「壤土～埴土」の使用時期「移植後3日～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで」を「移植直後～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで」へ変更する。
- 作物名「移植水稻」の適用地帯「関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」の適用土壌「壤土～埴土」に使用時期「移植時」を追加する。

下線が変更部分、**太字**が追加部分です。

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北、北陸) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植時	壤土 ～埴土	3 kg/10a	1回	田植同時散布機で施用	関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯
		<u>移植直後～ノビエ1.5葉期</u> <u>ただし、移植後30日まで</u>	砂壤土			湛水散布	
	移植後3日～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土 ～埴土		全域(関東・東山・東海を除く)の普通期及び早期栽培地帯			
	移植時	壤土 ～埴土	2 kg/10a	田植同時散布機で施用		北海道 東北 北陸	
	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで				湛水散布	

ブタクロールを含む 農薬の総使用回数	ACNを含む 農薬の総使用回数
2回以内	3回以内

アグロ カネショウ株式会社