

土壤燻蒸剤  
**D-D**  
D-D剤

平成26年8月8日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

●作物名「つるむらさき」、「にら」、「みずな」、「さやいんげん」、「チンゲンサイ」を追加する。

太字が追加部分です。

| 作物名  | 適用病害虫名                            | 使用量                         | 使用時期         | 使用回数 | 使用方法  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|------|---|
| <b>つるむらさき、みずな、にら</b><br><b>さやいんげん、チンゲンサイ</b><br>キャベツ、こまつな、はくさい、パセリ、レタス、非結球レタス、ほうれんそう、みつばいちご、オクラ、かぼちゃ、すいか、きゅうり、にがうり、とうがらし類、ミニトマト、トマト、なす、ピーマン、まくわうり、メロン、かぶ、ごぼう、だいこん、にんじん、もりあざみ、かんしょ、はつかだいこん、こんにやく、さといも、しょうが、てんさい、らっきょう、みしまさいこ、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、うど、らっかせい、やまのいも、食用ぎく、しそ、しそ(花穂)、バジル、ねぎ、薬用にんじん、花き類・観葉植物 | ネコブセンチュウ<br>ネグサレセンチュウ<br>コガネムシ類幼虫 | 15~20L/10a<br>(1穴当り1.5~2ml) | 作付の10~15日前まで | 1回   | 1) 全面処理<br>耕起整地後、縦横30cm間隔の基盤の目に切り千鳥状に深さ15~20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。<br><br>2) 作条処理<br>は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 |
| 樹木類  |                                   |                             | 植付の10~15日前まで |      |   |
| うり類(賣物用)   | センチュウ類<br>コガネムシ類幼虫                |                             |              |      |   |
| だいず<br>えだまめ  | ダイズシストセンチュウ                       | 20L/10a(1穴当り2ml)            |              |      |   |
| すぎ・ひのき(は種用)<br>すぎ・ひのき(床替用)   | ネコブセンチュウ<br>ネグサレセンチュウ<br>コガネムシ類幼虫 | 15~20L/10a<br>(1穴当り1.5~2ml) | 作付の10~15日前まで |      |   |
| ばいしょ   | ネグサレセンチュウ<br>ネコブセンチュウ             |                             |              |      |   |
|  | ジャガイモシストセンチュウ                     | 30~40L/10a<br>(1穴当り3~4ml)   |              |      |   |
| たばこ  | ネコブセンチュウ<br>ネグサレセンチュウ             | 20L/10a<br>(1穴当り2ml)        | 作付の30~45日前まで |      |   |
|  |                                   | 4~6L/10a<br>(1穴当り1.3~2ml)   | 作付の30~45日前まで |      |   |
| 茶  | ネコブセンチュウ                          | 20L/10a<br>(1穴当り2ml)        | 作付の10~15日前まで |      |   |