

殺菌剤
アフェットフロアブル
ペンチオピラド水和剤

平成26年8月8日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名に「豆類(未成熟、ただし、さやえんどうを除く)」、「さやえんどう」、「ししとう」、「かぼちゃ」、「にがうり」、「オクラ」、「はくさい」、「しそ」、「ブロッコリー」、「にんじん」、「小粒核果類(すももを除く)」、「すもも」、「ズッキーニ」を追加する。
- 作物名「すいか」の適用病害虫名に「うどんこ病」を追加する。
- 作物名「たまねぎ」の適用病害虫名に「小菌核病」を追加する。

太字が拡大部分です。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数	
しそ	灰色かび病	2000倍	100~3000 /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内	
キャベツ	菌核病、株腐病			収穫前日まで	3回以内		株元灌水	3回以内
きゅうり	灰色かび病、菌核病、うどんこ病							
メロン	つる枯病	2000~4000倍	100~3000 /10a	収穫前日まで	3回以内	株元灌水	3回以内	
すいか	菌核病、つる枯病、 うどんこ病							
ズッキーニ、かぼちゃ、にがうり	うどんこ病	2000倍	10/株	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
トマト、ミニトマト	菌核病、すすかび病、灰色かび病、葉かび病	2000~4000倍						
ピーマン	うどんこ病							
ピーマン	灰色かび病、黒枯病	2000倍	10/株	収穫前日まで	3回以内	株元灌水	3回以内	
	白絹病							
	うどんこ病	2000~4000倍	100~3000 /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
ししとう	灰色かび病、うどんこ病、黒枯病							
なす	灰色かび病、菌核病、すすかび病、うどんこ病	2000倍	100~3000 /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
いちご、 オクラ	灰色かび病、うどんこ病							
ねぎ	白絹病	1000~2000倍	10/m ²	生育期 但し、 収穫14日前まで	2回以内	株元灌水	4回以内(株元 灌水は2回以内、 散布は2回以内)	
	さび病、黒斑病、小菌核腐敗病	2000倍	100~3000 /10a	収穫前日まで	4回以内	散布	3回以内	
たまねぎ	灰色かび病、灰色腐敗病、 小菌核病							
アスパラガス	褐斑病、斑点病、茎枯病							
レタス、非結球レタス	灰色かび病、菌核病、すす枯病	2000倍	100~3000 /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
はくさい	黒斑病							
ブロッコリー	菌核病							
にんじん	黒葉枯病	2000倍	100~3000 /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	
豆類(未成熟、ただし、 さやえんどうを除く)	灰色かび病、菌核病			収穫7日前まで				
さやえんどう	灰色かび病、菌核病、さび病			収穫前日まで				
小粒核果類(すももを除く)	灰星病、黒星病	2000倍	200~7000 /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	
すもも、もも、ネクタリン	灰星病、黒星病			収穫前日まで				
おうとう	灰星病、幼果菌核病							
なし	黒星病、赤星病、うどんこ病	2000倍	200~7000 /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
りんご	黒星病、赤星病、黒点病、褐斑病、うどんこ病、 斑点落葉病、モニリア病、すす斑病、すす点病							
かき	落葉病							
みかん	灰色かび病、そうか病	2000倍	100~3000 /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
ぶどう	灰色かび病、晩腐病、黒とう病、 うどんこ病、褐斑病、さび病							
チューリップ	褐色斑点病、灰色かび病							
きく	白さび病、灰色かび病	100~3000 /10a	100~3000 /10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内	
花き類・観葉植物 (きく、チューリップを除く)	灰色かび病							