

殺虫剤

アルバリン顆粒水溶剤

ジノテフラン水溶剤

平成 26 年 8 月 27 日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「とうもろこし(子実)」を追加する。
- 「セルリー」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。
- 「ズッキーニ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。
- 「だいこん」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)」に変更する。
- 「ふき」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。

**太字**が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
<b>とうもろこし(子実)</b>	—	ムギクビレアブラムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
セルリー		アブラムシ類			収穫14日前まで	2回以内		<u>3回以内</u> ( <u>定植時の土壌混和は1回以内、</u> <u>散布は2回以内</u> )
ズッキーニ					収穫前日まで			<u>4回以内</u> ( <u>定植時の土壌混和は1回以内、</u> <u>定植後の株元散布は1回以内、</u> <u>散布は2回以内</u> )
だいこん		アブラムシ類	2000～3000倍		収穫7日前まで	<u>5回以内</u> ( <u>は種時の播溝土壌混和は1回以内、</u> <u>は種時の全面土壌混和は1回以内、</u> <u>粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び</u> <u>液剤の散布は合計2回以内</u> )		
		キスジノミハムシ	1000倍					
ふき	コナジラミ類	2000倍	<u>3回以内</u> ( <u>土壌表面散布は1回以内、</u> <u>散布は2回以内</u> )					