

植物成長調整剤
ターム水溶剤
1-ナフタレン酢酸ナトリウム水溶剤

平成27年2月4日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

●作物名「温州みかん」の使用目的「全摘果」及び「間引き摘果」をまとめ「摘果」へ変更する。

下線が変更部分です。

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	1-ナフタレン酢酸を含む農薬の総使用回数
温州みかん	<u>摘果</u>	500～1000倍	250～500L/10a	一次生理落果発生期 (満開10～20日後)	1回	立木全面 散布又は 枝別散布	4回以内 (生理落果発生 期は1回以内、 生理落果発生後 は3回以内)
		1000～1500倍		二次生理落果発生期 (満開20～40日後)			
	結果母枝の充実、 着花促進	1000～2000倍		夏秋梢萌芽時 及び再萌芽時 但し、収穫前日まで	2回		
				新梢萌芽前 但し、収穫前日まで	2～3回		
かんきつ (温州みかんを 除く)	摘果	1000～1500倍		生理落果発生期 (満開10～50日後)	1回		3回以内 (果実肥大期 は2回以内)
	夏秋梢伸長抑制	1000～2000倍		新梢萌芽時及び 再萌芽時 但し、収穫前日まで	2～3回		
	果実肥大促進	4000～8000倍		果実肥大期 但し、収穫前日まで	2回		
	後期落果防止	1000倍		果実着色期 ～収穫予定14日前	1～2回		
オリーブ (交互結実栽培 の非収穫年樹)	全摘果	1500～2000倍	非収穫年の 満開期	1回	散布	1回	