

殺虫剤
兼商バイスロイドEW
シフルトリン乳剤

平成27年4月8日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「りんご」に「カメムシ類（2000倍）」を追加。
- 作物名「りんご、なし、大粒種ぶどう、もも、おうとう、小粒核果類、かき、かんきつ」に使用液量「200～700L/10a」を記載。
- 作物名「だいず、えだまめ、食用ぎく」に使用液量「100～300L/10a」を記載。
- 作物名「たばこ」に使用液量「100～180L/10a」を記載。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルトリンを含む農薬の総使用回数					
りんご	キンモンホソガ アブラムシ類 ギンモンハモグリガ モモチョッキリゾウムシ シンクイムシ類	2000～3000倍	200～ 700L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内					
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ ヨモギエダシャク	2000倍										
なし	ハマキムシ類 シンクイムシ類 アブラムシ類	2000倍						2回以内	2回以内			
大粒種ぶどう	チャノキイロアザミウマ コガネムシ類	2000～3000倍						2000倍	3回以内	3回以内		
	モモハモグリガ アブラムシ類 シンクイムシ類	2000倍										
もも	ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ	4000倍						2回以内	2回以内			
おうとう	アブラムシ類	3000倍						2000倍	3回以内	3回以内		
かき	チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ カキノヘタムシガ	2000倍									3回以内	3回以内
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ	2000倍									5回以内	5回以内
だいず	カメムシ類	1000倍						100～ 300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
えだまめ			収穫14日前まで									
食用ぎく	アザミウマ類	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内						
たばこ	タバコガ ヨトウムシ	2000～3000倍	100～ 180L/10a	収穫10日前まで	2回以内	2回以内						
	アブラムシ類											

