

適用拡大情報

農林水産省登録
第 6 7 4 6 号

除草剤
カソロン粒剤
DBN 粒剤

平成 27 年4月22日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「日本芝」のDBNを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「3回以内」へ変更。

下線が変更部分です。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	DBNを含む農薬の総使用回数
日本芝	—	一年生雑草 多年生広葉雑草	秋期雑草発生前 ～発生始期	埴土～壤土	8～10kg/10a (1㎡当り 8～10g)	2回 以内	全面土壌 散布	<u>3回</u> <u>以内</u>
いぐさ		スズメクサ ジノハ 水田一年生雑草 マザイ	1月～4月 (雑草発生始期)	埴土～壤土 (減水深 0.5cm/日以下)	3～6kg/10a		湛水散布	2回 以内
しちとうい		水田一年生雑草 マザイ ジノハ	移植後 7～10日	腐植こ富む 埴土～壤土 (減水深 0.5cm/日以下)	3～4kg/10a			
水稻 (刈取跡)	水稻 刈取跡	マザイ	水稻刈取後 7～10日まで	埴土～壤土	5～6kg/10a	1回	全面土壌 散布	1回
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 等	一年生雑草	雑草の発生前 ～発生始期	—	17～20kg/10a (1㎡当り 17～20g)	3回 以内	植栽地を 除く樹木等 の周辺地に 散布	3回 以内
		多年生広葉雑草 ササ			20～40kg/10a (1㎡当り 20～40g)			