

殺虫剤
サムコルフロアブル10
クロラントラニプロール水和剤

平成 27 年 5 月 13 日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「りんご」に希釈倍数「2500～5000倍」で適用病害虫「ヒメボクトウ」を追加する。
- 作物名「おうとう」の適用病害虫「ケムシ類」における希釈倍数「2500倍」を「2500～5000倍」に変更する。
- 作物名「なし」に適用病害虫「ヒメボクトウ」を希釈倍数「5000倍」にて追加する。
- 作物名「かき」に適用病害虫「ケムシ類」及び「ハスモンヨトウ」を希釈倍数「5000倍」にて追加する。

下線が変更部分、**太字**が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数
茶	チャノカクモンハマキ チャハマキ ヨモギエダシヤク	2000倍	200～400L/10a	摘採3日前まで	1回		1回
	チャノカガ ハスモンヨトウ	2000～4000倍 4000倍					
	りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 キモンホカガ ギンモンホメグリガ ケムシ類 ヒメボクトウ					
ぶどう	ヨモギエダシヤク		200～700L/10a	収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ハマキムシ類 モンキクロノメガ ケムシ類	5000倍					
おうとう	ハマキムシ類	2500～5000倍					
	ケムシ類	<u>2500～5000倍</u>					
	オウトウショウジヨウバエ	2500倍					
なし	ケムシ類 シンクイムシ類	2500～5000倍					
	ハマキムシ類 ヒメボクトウ						
もも	シンクイムシ類	5000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
初刈り	モモホメグリガ ハマキムシ類						
かき	ヒロヘリアオイラガ カキノハタムガ ハマキムシ類 ケムシ類 ハスモンヨトウ			収穫前日まで			
	うめ	ケムシ類					
すもも	ハマキムシ類	2500倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	シンクイムシ類						
あんず	ケムシ類	2500～5000倍		収穫3日前まで			
	ハマキムシ類	2500倍					
さとうきび	イネトリ	5000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで			