

適用拡大情報

農林水産省登録
第23133号

殺菌剤
兼商フルーツセイバー
ペンチオピラド水和剤

平成27年5月27日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の希釈倍数「1500倍」を「1500～2000倍」に変更し、作物名「みかん」と統合し、「かんきつ」に変更する。

下線が変更部分です。

>

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数 |
|-------------|---|-------------------|------------------|---------|---------|------|--------------------|
| おうとう | 灰星病 幼果菌核病 炭疽病 | 1500倍 | 200～700L /10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 赤星病 うどんこ病 | 1500～3000倍 | | 収穫前日まで | | | |
| ぶどう | 灰色かび病 黒とう病 晩腐病 さび病 うどんこ病 褐斑病 | 1500倍 | | 収穫7日前まで | | | |
| もも ネクタリン | 黒星病 灰星病 | | | 収穫前日まで | | | |
| すもも | 灰星病 | | | | | | |
| りんご | 赤星病 うどんこ病 | 1500～3000倍 | | 収穫前日まで | | | |
| | 黒星病 モニリア病 すす点病 すす斑病 斑点落葉病 | 1500～2000倍 | | | | | |
| | 黒点病 褐斑病 | 2000倍 | | | | | |
| <u>かんきつ</u> | 灰色かび病 そうか病 | <u>1500～2000倍</u> | | | | | |
| かき | うどんこ病 | 1500～2000倍 | | | | | |
| | 灰色かび病 落葉病 | 1500倍 | | | | | |