

殺菌剤
兼商モレスタン水和剤
キノキサリン系水和剤

平成28年3月16日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「きゅうり、トマト、すいか、メロン、まくわうり、かぼちゃ、ピーマン、なす、しそ、にがうり、オクラ、いちご、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、はすいも(葉柄)」に使用液量「100～300L/10a」を記載。
- 作物名「かき、みかん」に使用液量「200～700L/10a」を記載。
- 作物名「食用さくら(葉)、こでまり、ポインセチア」に使用液量「100～700L/10a」を記載。
- 作物名「桑」に使用液量「200～700L/10a」を記載。
- 作物名「花き類・観葉植物(カーネーションを除く)、カーネーション」に使用液量「100～300L/10a」を記載。
- 作物名「樹木類(こでまり、ポインセチア、やなぎを除く)、やなぎ」に使用液量「100～700L/10a」を記載。
- 作物名「桑：ハダニ類、カーネーション：ハダニ類、ポインセチア：コナジラミ類、やなぎ：ハダニ類」に使用時期「発生初期」を記載。
- 作物名「桑：裏うどんこ病、花き類・観葉植物(カーネーションを除く)：うどんこ病、カーネーション：うどんこ病、樹木類(こでまり、ポインセチア、やなぎを除く)：うどんこ病、こでまり：うどんこ病、ポインセチア：うどんこ病、やなぎ：うどんこ病」に使用時期「発病初期」を記載。
- 作物名「桑、花き類・観葉植物(カーネーションを除く)、カーネーション、樹木類(こでまり、ポインセチア、やなぎを除く)、こでまり、ポインセチア、やなぎ」に本剤の使用回数及びキノキサリン系を含む農薬の総使用回数いずれも「10回以内」を記載。

【変更後】

太字が追加、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	キ/カリン系を 含む農薬の 総使用回数
きゅうり	うどんこ病	2000~4000 倍	100~ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	コナジラミ類	2000 倍					
トマト	コナジラミ類	1500~2000 倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	トマトサビダニ						
すいか	うどんこ病	2000~4000 倍		収穫3日前まで	10回以内		10回以内
メロン							
まくわうり							
かぼちゃ	うどんこ病	2000~3000 倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
ピーマン							
なす	うどんこ病	2000 倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
	チャノホコリダニ						
しそ	ハダニ類	3000 倍		収穫10日前まで	2回以内		2回以内
にがうり	うどんこ病	2000 倍					
オクラ	ハダニ類	3000 倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内		
いちご	うどんこ病						
	かき	うどんこ病	3000~4000 倍	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	
みかん	ハダニ類	1000~2000 倍					
	みかん	チャノホコリダニ	1000 倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
ミカンサビダニ							
みょうが(花穂)	ハダニ類	3000 倍	100~ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布、 但し花穂の発生期に はマルチフィルム被 覆により散布液が直 接花穂に飛散しない 状態で使用する	3回以内
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂) の収穫前日まで 但し、花穂を収 穫しない場合に あつては開花期 終了まで			
				収穫前日まで			
はすいも(葉柄)				うどんこ病			
食用さくら(葉)	うどんこ病	1000~2000 倍	200~ 700L/10a	発生初期	10回以内	散布	10回以内
	裏うどんこ病						
花き類・観葉植物 (カーネーションを除く)	うどんこ病	2000~3000 倍	100~ 300L/10a	発病初期	10回以内	散布	10回以内
	カーネーション			ハダニ類			
樹木類 (こでまり、ポインセ チア、やなぎを除く)	うどんこ病	2000 倍	100~ 700L/10a	発病初期	10回以内	散布	10回以内
				こでまり			
ポインセチア	コナジラミ類	1000~2000 倍	100~ 700L/10a	発生初期	10回以内	散布	10回以内
	うどんこ病	2000 倍		発病初期			
やなぎ	ハダニ類	1000 倍	100~ 700L/10a	発生初期	10回以内	散布	10回以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	キ/カリン系を 含む農薬の 総使用回数
ピーマン	温室、ガラス室、 ビニールハウス等 密閉できる場所	うどんこ病	20g/100m ³ (50m ² ×2m)	—	収穫前日まで	3回以内	くん煙	3回以内
きゅうり			50~100g/10a				5 L/10a	
メロン			100g/10a	収穫3日前まで	10回以内	10回以内		