

殺虫剤  
サムコルフロアブル10  
クロラントラニプロール水和剤

平成 28 年 6 月 8 日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- ・作物名「ぶどう」に適用病害虫名「クビアカスカシバ」を希釈倍数「5000 倍」にて追加する。
- ・作物名「かき」に適用病害虫名「フタモンマダラメイガ」を希釈倍数「5000 倍」にて追加する。
- ・作物名「うめ」に適用病害虫名「ノコメトガリキリガ」を希釈倍数「5000 倍」にて追加する。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	
茶	チャノカクモノハマキ チャハマキ ヨモギエダシヤク	2000倍	200～ 400L/10a	摘採 3日前まで	1回	散布	1回	
	チャノカガ ハスモンヨトウ	2000～4000倍 4000倍						
	りんご	シクイムシ類 ハマキムシ類 キモノホガ ギンモンハモグリガ ケムシ類 ヒメダマク						2500～5000倍
	ぶどう	ハマキムシ類 モンキクロノメガ ケムシ類 <b>クビアカスカシバ</b>						5000倍
おうとう	ハマキムシ類 ケムシ類	2500～5000倍	200～ 700L/10a	収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	オウトウショウジ ヨウバエ	2500倍						
なし	ケムシ類 シクイムシ類	2500～5000倍						
	ハマキムシ類 ヒメダマク	5000倍						
もも	シクイムシ類			収穫 3日前まで	2回以内	2回以内		
初刈	モモハモグリガ ハマキムシ類							
かき	ヒロハリアオイガ カキハタムシガ ハマキムシ類 ケムシ類 ハスモンヨトウ <b>フタモンマダラメイガ</b> <b>ノコメトガリキリガ</b>			5000倍	収穫前日 まで	3回以内	3回以内	
	うめ	ケムシ類 ハマキムシ類			収穫14日前 まで			
すもも	シクイムシ類	2500倍		収穫 3日前まで	3回以内	4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内)		
	あんず	ケムシ類 ハマキムシ類					2500～5000倍 2500倍	
さとうきび	イネトウ	5000倍	100～ 300L/10a	収穫 30日前まで				

