

殺菌剤  
**アフエツトフロアブル**  
ペンチオピラド水和剤

平成 28年 10 月 19 日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- ・作物名「いちご」の適用病害虫名に「輪斑病」を追加する。
- ・作物名「セルリー」「しょうが」「いんげんまめ」「しそ(花穂)」「あずき」を追加する。
- ・作物名「豆類(未成熟、ただしさやえんどうを除く)」と「さやえんどう」を統合し、「豆類(未成熟)」とする。
- ・作物名「はくさい」の適用病害虫名に「白斑病」を追加する。

下線が変更部分、**太字**が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数				
キャベツ	菌核病、株腐病、根朽病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
はくさい	黒斑病、 <b>白斑病</b>										
ブロッコリー	菌核病										
きゅうり	灰色かび病										
すいか	菌核病										
	うどんこ病										
メロン	つる枯病	2000～4000 倍	100～300 L /10a	3 回以内	散布	3 回以内					
トマト	うどんこ病										
	ミニトマト	灰色かび病、菌核病、葉かび病、すすかび病	2000 倍	1L/株	3 回以内	株元灌注	3 回以内				
うどんこ病		2000～4000 倍									
ピーマン	灰色かび病、黒枯病	2000～4000 倍	1L/株	3 回以内	株元灌注	3 回以内					
	うどんこ病										
なす	白絹病	2000 倍	100～300 L /10a	3 回以内	散布	3 回以内					
ししとう	灰色かび病、菌核病、うどんこ病、すすかび病										
	灰色かび病、うどんこ病、黒枯病										
	うどんこ病										
かぼちゃ	うどんこ病						2000 倍	100～300 L /10a	3 回以内	散布	3 回以内
にがうり											
ズッキーニ	うどんこ病						2000 倍	100～300 L /10a	3 回以内	散布	3 回以内
オクラ											
いちご	灰色かび病、うどんこ病						2000 倍	100～300 L /10a	3 回以内	散布	3 回以内
	<b>輪斑病</b>										
<b>しょうが</b>	白星病	2000 倍	100～300 L /10a	3 回以内	散布	3 回以内					
<u>豆類</u> (未成熟)	灰色かび病、菌核病、さび病										
<b>あずき</b>	灰色かび病、菌核病、さび病	2000 倍	100～300 L /10a	3 回以内	散布	3 回以内					
<b>しそ(花穂)</b>	灰色かび病										
					2 回以内	2 回以内					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数			
<b>いんげんまめ</b>	灰色かび病 菌核病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内			
レタス 非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病									
にら	白斑葉枯病							収穫 7 日前まで	1 回	1 回
にら(花茎)	さび病							収穫前日まで		2 回以内
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～2000 倍	1L/m <sup>2</sup>	生育期 但し、 収穫 14 日前まで	2 回以内	株元 灌注	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、 散布は 2 回以内)			
		白絹病 さび病 黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病								
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内			
アスパラガス	茎枯病 褐斑病 斑点病									
<b>セルリー</b>	斑点病									
にんじん	黒葉枯病							収穫 7 日前まで	3 回以内	3 回以内
しそ	灰色かび病				収穫 3 日前まで	2 回以内	2 回以内			
小粒核果類 もも ネクタリン	黒星病 灰星病				200～700 L /10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内	
おうとう	灰星病 幼果菌核病									
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病									
ぶどう	灰色かび病 晩腐病 黒とう病 褐斑病 うどんこ病 さび病									収穫 7 日前まで
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニア病 黒点病 すす点病 すす斑病									収穫前日まで
かんきつ	灰色かび病 そうか病									
かき	落葉病	100～300 L /10a	発病初期							
きく	白さび病 灰色かび病									
ゆり	葉枯病 灰色かび病									
チューリップ	褐色斑点病 灰色かび病									
花き類・ 観葉植物 (きく、ゆり、 チューリップを除く)	灰色かび病									

