

殺虫剤

アルバリン粒剤

ジノテフラン粒剤

平成 28 年 11 月 30 日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「オクラ」、「ズッキーニ」、「とうがらし類」の使用時期「生育期 但し、収穫 14 日前まで」を「生育期 但し、収穫開始 14 日前まで」に変更する。
- 作物名「なす」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3 回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 2 回以内)」に変更する。
- 作物名「きゅうり」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「4 回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計 1 回以内、定植後の株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)」に変更し、使用時期「生育期 但し、収穫 14 日前まで」を「生育期 但し、収穫開始 14 日前まで」に変更する。
- 作物名「メロン」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3 回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計 1 回以内、散布は 2 回以内)」に変更する。
- 作物名「トマト」、「ミニトマト」の使用時期及び使用方法に「は種前」及び「培土混和」を追加する。
- 作物名「トマト」、「ミニトマト」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「5 回以内(培土混和及び灌注は合計 1 回以内、育苗期の株元散布は 1 回以内、定植時の土壤混和は 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 2 回以内)」に変更する。

太字が追加部分、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
ズッキーニ	コナジラミ類	2g/株	定植時	1 回	植穴 土壤混和	4 回以内 (定植時の土壤混和は 1 回以内、定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)	
	アブラムシ類		<u>生育期</u> <u>但し、収穫開始</u> <u>14 日前まで</u>		株元散布		
とうがらし類	アザミウマ類	1~2g/株	定植時		1 回	植穴 土壤混和	4 回以内 (育苗期の株元散布及 び定植時の土壤混和 は合計 1 回以内、定植 後の株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
	アブラムシ類	1g/株	<u>生育期</u> <u>但し、収穫開始</u> <u>14 日前まで</u>			株元散布	
			育苗期				
オクラ	アブラムシ類	9kg/10a	<u>生育期</u> <u>但し、収穫開始</u> <u>14 日前まで</u>		1 回	株元散布	3 回以内 (株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数		
きゅうり	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	<u>4回以内</u> <u>(育苗期の株元散布及び定植時の</u> <u>土壌混和は</u> <u>合計1回以内、</u> <u>定植後の株元散布は</u> <u>1回以内、散布は</u> <u>2回以内)</u>		
	ハモグリバエ類 アザミウマ類		定植時		植穴土壌混和			
	コナジラミ類 アブラムシ類	1~2g/株	育苗期		株元散布			
	コナジラミ類 アブラムシ類	1g/株	<u>生育期</u> <u>但し、収穫開始</u> <u>14日前まで</u>					
		1~2g/株	定植時				植穴土壌混和	
メロン	アブラムシ類	1g/株	育苗期		株元散布		<u>3回以内</u> <u>(育苗期の株元散布</u> <u>及び定植時の</u> <u>土壌混和は</u> <u>合計1回以内、</u> <u>散布は2回以内)</u>	
			定植時		植穴土壌混和			
	コナジラミ類	1~2g/株	育苗期		株元散布			
			定植時		植穴土壌混和			
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	育苗期		株元散布			
定植時			植穴土壌混和					
なす	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	2回以内	株元散布	<u>3回以内</u> <u>(育苗期の株元散布</u> <u>及び定植時の</u> <u>土壌混和は</u> <u>合計1回以内、</u> <u>散布及び</u> <u>定植後の株元散布は</u> <u>合計2回以内)</u>		
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	1~2g/株	定植時		植穴 土壌混和			
	コナジラミ類		育苗期		株元散布			
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和			
	コナジラミ類 アブラムシ類		生育期 但し、 収穫前日まで		株元散布			
コナジラミ類	は種前		1回		培土混和			
トマト ミニトマト	コナジラミ類	培土1L 当り 10g	は種前		1回		培土混和	<u>5回以内</u> <u>(培土混和及び</u> <u>灌注は合計1回以内、</u> <u>育苗期の株元散布は</u> <u>1回以内、</u> <u>定植時の土壌混和は</u> <u>1回以内、散布及び</u> <u>定植後の株元散布は</u> <u>合計2回以内)</u>
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時				植穴土壌混和	
	コナジラミ類		育苗期		株元散布			
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、 収穫前日まで				2回以内	
			定植時	1回		植穴土壌混和		

