

殺虫剤

アルバリン顆粒水溶剤

ジノテフラン水溶剤

平成 28 年 11 月 30 日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「ぶどう」の適用病害虫名に「**クビアカサカハ**」を追加する。
- 作物名「トマト」、「ミニトマト」の使用方法「灌注」の使用時期を「定植時」から「鉢上時又は定植時」に変更する。
- 作物名「トマト」、「ミニトマト」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)」に変更する。
- 作物名「ピーマン」の適用病害虫名に「**カマシ**類」を追加する。
- 作物名「なす」の適用病害虫名に「**カマシ**類」を追加する。
- 作物名「なす」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)」に変更する。
- 作物名「きゅうり」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更する。
- 作物名「メロン」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)」に変更する。
- 作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげを除く)」を追加する。
- 作物名「えだまめ」の適用病害虫名に「**アブラムシ**類」、「**ハゲリハエ**類」を追加する。
- 作物名「未成熟ささげ」の適用病害虫名に「**ハゲリハエ**類」を追加する。
- 作物名「さやいんげん」の適用病害虫名に「**ハゲリハエ**類」を追加する。
- 作物名「モロヘイヤ」を追加する。
- 作物名「かんきつ」の適用病害虫名に「**アハハコ**」を追加する。
- 作物名「小粒核果類」の適用病害虫名に「**シクイ**類」を追加する。
- 作物名「オリーブ(葉)」を追加する。
- 作物名「樹木類(つつじ類を除く)」を「樹木類(つつじ類、つばき類を除く)」、「つばき類」に分割し、「つばき類」の使用方法に「株元灌注」を追加し、「つばき類」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「5回以内(株元灌注は2回以内)」に変更する。

下線が変更部分、**太字**が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
ぶどう	コナカイガラムシ類	20~40g/樹	幼果期まで 但し、収穫30日前まで	1回	本剤1g当り水1mLの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。	3回以内 (塗布は1回以内)
	クビアカサカハ	40g/樹				

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数				
トマト ミニトマト	—	コナジラミ類	100 倍	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5～4.0L) 当り 0.5L	<u>鉢上時</u> 又は <u>定植時</u>	1 回	灌注	<u>5 回以内</u> (<u>培土混和及び</u> <u>灌注は合計 1 回</u> <u>以内、育苗期の</u> <u>株元散布は 1 回</u> <u>以内、定植時の</u> <u>土壌混和は 1 回</u> <u>以内、散布及び</u> <u>定植後の株元散</u> <u>布は合計 2 回</u> <u>以内</u>)				
			2000～ 3000 倍									
アブラムシ類		3000 倍	100～300L /10a						収穫前日 まで	2 回以内	散布	<u>3 回以内</u> (<u>育苗期の株元</u> <u>散布及び定植</u> <u>時の土壌混和</u> <u>は合計 1 回以</u> <u>内、散布及び</u> <u>定植後の株元</u> <u>散布は合計 2</u> <u>回以内</u>)
コナジラミ類		2000～ 3000 倍										
アブラムシ類		3000 倍										
アザミウマ類 カムシ類		2000 倍										
アザミウマ類 カムシ類		2000 倍										
アブラムシ類 コナジラミ類		2000～ 3000 倍										
アザミウマ類 ウリハムシ		2000 倍										
コナジラミ類		2000～ 3000 倍										
アブラムシ類	3000 倍											
アザミウマ類	2000 倍											
メロン					収穫 3 日 前まで			<u>3 回以内</u> (<u>育苗期の株元</u> <u>散布及び定植</u> <u>時の土壌混和</u> <u>は合計 1 回以</u> <u>内、散布は 2 回</u> <u>以内</u>)				

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数		
豆類 (未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささを除く)	—	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000 倍	100～300L /10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内		
えだまめ		カメムシ類 ダイズサヤタマハエ アブラムシ類 ハモグリバエ類								
未成熟ささげ		フタスジヒメハムシ	3000 倍							
さやいんげん		アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000 倍	200～700L /10a	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内 (株元散布は 1 回以内、散布 は 2 回以内)		
モロヘイヤ		アザミウマ類	2000 倍					2 回以内		
かんきつ		チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～ 2000 倍					2000 倍	3 回以内	3 回以内
		ゴマダラカミキリ	1000 倍							
		アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 ミカンハエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ ミカンキシラミ コナジラミ類 チャノミドリヒメヨコバイ アオハハコロモ								
小粒核果類		アブラムシ類 カメムシ類 シクイムシ類								
オリーブ(葉)		カメムシ類			収穫 14 日前まで	2 回以内		2 回以内		
<u>樹木類</u> (つつじ類、 つばき類を除く)	ケムシ類	2000 倍	100～700L /10a	発生初期	5 回以内	5 回以内				
<u>つばき類</u>	チャドクガ	100 倍	0.5～2L/樹 (但し、220L /10a まで)		2 回以内	株元 灌注	<u>5 回以内</u> (株元灌注は <u>2 回以内</u>)			

