

殺虫剤
兼商ベネビアOD
シアントラニリプロール水和剤

平成 29 年 3 月 22 日付けで以下の通り適用拡大されました。

＜変更内容＞

- ・ 作物名「ミニトマト」「たまねぎ」を下記のとおり追加する。

太字が拡追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナカ、アオムシ、ヨウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメカイ ウハバ類、オオタバコガ	2000～4000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000 倍					
はくさい	コナカ、アオムシ、ヨウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメカイ	2000～4000 倍					
	アブラムシ類	2000 倍					
だいこん	コナカ、アオムシ ハイマダラノメカイ、カブラハバチ	2000～4000 倍					
	ヨウムシ	4000 倍					
	アブラムシ類、ハモグリハエ類 キヌシノミムシ	2000 倍					
ブロッコリー	アオムシ、ハスモンヨトウ、コナカ	2000～4000 倍					
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000 倍					
トマト ミニトマト	オオタバコガ	2000～4000 倍					
	ハモグリハエ類 コナジラミ類、アブラムシ類	2000 倍					
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類、ハモグリハエ類 ウリノメカイ						
ピーマン	アブラムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類	2000～4000 倍					
	オオタバコガ						
レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨウムシ	2000～4000 倍					
	ハモグリハエ類、アブラムシ類						
ねぎ	シロイチモジヨトウ、アザミウマ類 ハモグリハエ類	2000 倍					
たまねぎ	ハモグリハエ類	2000～4000 倍	収穫 14 日前 まで	3 回以内			
いちご	ハスモンヨトウ						
	アザミウマ類、アブラムシ類 コナジラミ類						
えだまめ	アブラムシ類						
	ハスモンヨトウ、マシクイガ						
だいず	アブラムシ類						
	ナガイモガ、ハスモンヨトウ						
やまのいも	ハスモンヨトウ、ナジロシタバ		4000 倍				
かんしょ	ハスモンヨトウ		2000 倍				
ばれいし よ	アブラムシ類						
かぼちゃ	ハスモンヨトウ		4000 倍		収穫前日 まで		
たばこ	ヨウムシ		100～ 180L/10a		収穫 10 日前 まで	2 回 以内	2 回以内