

殺虫剤
ペイオフME液剤
フルシトリネート液剤

平成29年4月12日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「ナストビハムシ」を追加する。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルシトリネートを含む農薬の総使用回数	
豆類 (種実、ただし、 だいず、あずき、 らっかせいを除く)	アブラムシ類	2000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
えだまめ								
だいず	アブラムシ類 マメシクイガ							
あずき	アブラムシ類 アズキノメイガ							
キャベツ	アオムシ アブラムシ類 ヨトウムシ	1000~2000倍			1000倍		4回以内	4回以内
	コナガ							
はくさい	アブラムシ類	1000~2000倍	1000~2000倍	収穫21日前まで	3回以内		3回以内	
だいこん	アオムシ			収穫30日前まで				
ばれいしょ	ナストビハムシ							収穫7日前まで
	アブラムシ類	500倍	25L/10a					
	オオニジュウヤホシテントウ	2000倍	100~300L/10a					
てんさい	カメノコハムシ	1000~2000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	4回以内	4回以内		
	ヨトウムシ	500倍	25L/10a					
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~1500倍	100~300L/10a					
小麦	アブラムシ類	2000倍	60~150L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
未成熟とうもろこし			100~300L/10a	収穫14日前まで	1回	1回		
にんじん	ヨトウムシ				収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
おうぎ	アブラムシ類							