

殺虫剤

兼商ベネビアOD

シアントラニプロール水和剤

平成29年11月8日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- ・作物名「かぼちゃ」に、適用病害虫名「ハモグリバエ類」を、希釈倍数「2000倍」にて追加する。
- ・作物名「たまねぎ」に、適用病害虫名「アザミウマ類」及び「ハスモンヨトウ」を、希釈倍数「2000倍」にて追加する。
- ・作物名「いちご」のシアントラニプロールを含む農薬の総使用回数について、「3回以内」を「4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内)」に変更する。

太字が追加、下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	コガ、アオムシ、ヨウムシ、ハスモンヨトウ、 ハマダラメイト、ウバ類、オオタバコガ	2000～ 4000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内)		
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍							
はくさい	アブラムシ類	2000倍							
	コガ、アオムシ、ヨウムシ、ハスモンヨトウ、 ハマダラメイト	2000～ 4000倍							
だいこん	コガ、アオムシ、ハマダラメイト、 カブラバチ	2000～ 4000倍						4000倍	4回以内 (は種時の土壤 混和は1回以内、 散布は3回以内)
	ヨウムシ	4000倍							
ブロッコリー	アブラムシ類、ハモグリバエ類 キジノミムシ	2000倍							
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000～ 4000倍							
トマト ミニトマト	アオムシ、ハスモンヨトウ、コガ	2000～ 4000倍							
	オオタバコガ	4000倍							
きゅうり	ハモグリバエ類、コジラミ類、 アブラムシ類	2000倍							
	アブラムシ類、コジラミ類、ウバ類、 アザミウマ類、ハモグリバエ類	2000倍							
ピーマン	アブラムシ類、コジラミ類、アザミウマ類	2000倍							
	オオタバコガ	2000～ 4000倍							
レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨウムシ	4000倍							
	ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍							
ねぎ	シロイモシヨトウ、アザミウマ類、 ハモグリバエ類	2000倍							
いちご	ハスモンヨトウ	2000～ 4000倍	4回以内(灌注は1回以 内、散布は3回以内)						
	アザミウマ類、アブラムシ類、コジラミ類	2000倍							
えだまめ	アブラムシ類	2000～ 4000倍	3回以内						
	ハスモンヨトウ、マメシクイガ	4000倍							
だいず	アブラムシ類	2000倍							
やまのいも	カバノコガ、ハスモンヨトウ	4000倍	収穫7日 前まで						
かんしょ	ハスモンヨトウ、カシロシバ	4000倍	収穫前日 まで						
	ハスモンヨトウ	2000倍							
ばれいしょ	アブラムシ類	2000倍							
	<b>ハモグリバエ類</b>	4000倍							
かぼちゃ	ハスモンヨトウ	4000倍							
たばこ	ヨウムシ	4000倍	100～ 180L/10a	収穫10日 前まで	2回以内	2回以内			
たまねぎ	ハモグリバエ類、アザミウマ類、 ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫14日 前まで	3回以内	3回以内			